

ISSN 2518-1467 (Online),
ISSN 1991-3494 (Print)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

Х А Б А Р Ш Ы С Ы

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE BULLETIN

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

PUBLISHED SINCE 1944

5

SEPTEMBER – OCTOBER 2020

ALMATY, NAS RK

NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the most relevant and influential multidiscipline content to our community.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журналының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды одан әрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & Humanities Citation Index-ке қабылдау мәселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті және беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.

НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования в Emerging Sources Citation Index, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индексировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts & Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества.

Б а с р е д а к т о р ы

х.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі

М.Ж. Жұрынов

Р е д а к ц и я а л қ а с ы:

Абиев Р.Ш. проф. (Ресей)
Абылкасымова А.Е. проф., академик (Қазақстан)
Аврамов К.В. проф. (Украина)
Аппель Юрген проф. (Германия)
Баймұқанов Д.А. проф., академик (Қазақстан)
Баймұратов У.Б. проф., академик (Қазақстан)
Байтанаев Б.А. проф., академик (Қазақстан)
Байтулин И.О. проф., академик (Қазақстан)
Банас Иозеф проф. (Польша)
Берсимбаев Р.И. проф., академик (Қазақстан)
Велесько С. проф. (Германия)
Велихов Е.П. проф., РҒА академигі (Ресей)
Кабульдинов З.Е. проф. (Қазақстан)
Қажыбек Е.З. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Қалимолдаев М.Н. проф., академик (Қазақстан), бас ред. орынбасары
Қамзабекұлы Д. проф., академик (Қазақстан)
Қойгелдиев М.К. проф., академик (Қазақстан)
Лупашку Ф. проф., корр.-мүшесі (Молдова)
Мохд Хасан Селамат проф. (Малайзия)
Новак Изабелла проф. (Польша)
Огарь Н.П. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Полещук О.Х. проф. (Ресей)
Поняев А.И. проф. (Ресей)
Сагиян А.С. проф., академик (Армения)
Таймагамбетов Ж.К. проф., академик (Қазақстан)
Хрипунов Г.С. проф. (Украина)
Шәукенова З.К. проф., корр.-мүшесі (Қазақстан)
Юлдашбаев Ю.А. проф., РҒА академигі (Ресей)
Якубова М.М. проф., академик (Тәжікстан)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы».

ISSN 2518-1467 (Online),

ISSN 1991-3494 (Print)

Меншіктенуші: «Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы»РҚБ (Алматы қ.).

Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитетінде 12.02.2018 ж. берілген № 16895-Ж мерзімдік басылым тіркеуіне қойылу туралы куәлік.

Тақырыптық бағыты: *іргелі ғылымдар саласындағы жаңа жетістіктер нәтижелерін жария ету.*

Мерзімділігі: жылына 6 рет.

Тиражы: 2000 дана.

Редакцияның мекенжайы: 050010, Алматы қ., Шевченко көш., 28, 219 бөл., 220, тел.: 272-13-19, 272-13-18,
<http://www.bulletin-science.kz/index.php/en/>

© Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы, 2020

Типографияның мекенжайы: «NurNaz GRACE», Алматы қ., Рысқұлов көш., 103.

Г л а в н ы й р е д а к т о р
д.х.н., проф. академик НАН РК
М.Ж. Журинов

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

Абиев Р.Ш. проф. (Россия)
Абылкасымова А.Е. проф., академик (Казахстан)
Аврамов К.В. проф. (Украина)
Апель Юрген проф. (Германия)
Баймуканов Д.А. проф., академик (Казахстан)
Баймуратов У.Б. проф., академик (Казахстан)
Байтанаев Б.А. проф., академик (Казахстан)
Байтулин И.О. проф., академик (Казахстан)
Банас Иозеф проф. (Польша)
Берсимбаев Р.И. проф., академик (Казахстан)
Велесько С. проф. (Германия)
Велихов Е.П. проф., академик РАН (Россия)
Кабульдинов З.Е. проф. (Казахстан)
Кажыбек Е.З. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Калимолдаев М.Н. академик (Казахстан), зам. гл. ред.
Камзабекулы Д. проф., академик (Казахстан)
Койгельдиев М.К. проф., академик (Казахстан)
Лунашку Ф. проф., чл.-корр. (Молдова)
Мохд Хасан Селамат проф. (Малайзия)
Новак Изабелла проф. (Польша)
Огарь Н.П. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Полещук О.Х. проф. (Россия)
Поняев А.И. проф. (Россия)
Сагьян А.С. проф., академик (Армения)
Таймагамбетов Ж.К. проф., академик (Казахстан)
Хрипунов Г.С. проф. (Украина)
Шаукенова З.К. проф., чл.-корр. (Казахстан)
Юлдашбаев Ю.А. проф., академик РАН (Россия)
Якубова М.М. проф., академик (Таджикистан)

«Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан».

ISSN 2518-1467 (Online),

ISSN 1991-3494 (Print)

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы).

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации Министерства информации и коммуникаций и Республики Казахстан № **16895-Ж**, выданное 12.02.2018 г.

Тематическая направленность: *публикация результатов новых достижений в области фундаментальных наук.*

Периодичность: 6 раз в год.

Тираж: 2000 экземпляров.

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18.

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/en/>

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2020

Адрес типографии: «NurNazGRACE», г. Алматы, ул. Рыскулова, 103.

E d i t o r i n c h i e f

doctor of chemistry, professor, academician of NAS RK

M.Zh. Zhurinov

E d i t o r i a l b o a r d:

Abiyev R.Sh. prof. (Russia)
Abylkasymova A.E. prof., academician (Kazakhstan)
Avramov K.V. prof. (Ukraine)
Appel Jurgen, prof. (Germany)
Baimukanov D.A. prof., academician (Kazakhstan)
Baimuratov U.B. prof., academician (Kazakhstan)
Baitanaev B.A. prof., academician (Kazakhstan)
Baitullin I.O. prof., academician (Kazakhstan)
Joseph Banas, prof. (Poland)
Bersimbayev R.I. prof., academician (Kazakhstan)
Velesco S., prof. (Germany)
Velikhov Ye.P. prof., academician of RAS (Russia)
Kabuldinov Z.E. prof. (Kazakhstan)
Kazhybek E.Z. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Kalimoldayev M.N. prof., academician (Kazakhstan), deputy editor in chief
Kamzabekuly D. prof., academician (Kazakhstan)
Koigeldiev M.K. prof., academician (Kazakhstan)
Lupashku F. prof., corr. member (Moldova)
Mohd Hassan Selamat, prof. (Malaysia)
Nowak Isabella, prof. (Poland)
Ogar N.P. prof., corr. member (Kazakhstan)
Poleshchuk O.Kh. prof. (Russia)
Ponyaev A.I. prof. (Russia)
Sagiyani A.S. prof., academician (Armenia)
Tajmagambetov Zh.K. prof., academician (Kazakhstan)
Khripunov G.S. prof. (Ukraine)
Shaukenova Z.K. prof., corr. member. (Kazakhstan)
Yuldashbayev Y.A., prof., academician of RAS (Russia)
Yakubova M.M. prof., academician (Tadjikistan)

Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

ISSN 2518-1467 (Online),

ISSN 1991-3494 (Print)

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty).

The certificate of registration of a periodical printed publication in the Committee of information of the Ministry of Information and Communications of the Republic of Kazakhstan No. **16895-Ж**, issued on 12.02.2018.

Thematic focus: *publication of the results of new achievements in the field of basic sciences.*

Periodicity: 6 times a year.

Circulation: 2000 copies.

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/en/>

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2020

Address of printing house: «NurNaz GRACE», 103, Ryskulov str, Almaty.

UDC 638.123.56 (520)

V. G. Semenov¹, A. I. Skvortsov¹, V. N. Sattarov²,
D. A. Baimukanov^{3,5}, D. A. Doshanov⁴, D. K. Karibayeva⁵

¹Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Chuvash Republic, Russia;

²Bashkir State Pedagogical University named after Akmulla, Ufa, Russia;

³Baysyerke-Agro Educational Scientific and Production Center LLP, Talgar district, Almaty region, Kazakhstan;

⁴South Kazakhstan State University named after M. Auezov, Shymkent, Kazakhstan;

⁵Kazakh Scientific Research Institute of Animal Breeding and Fodder Production, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: semenov_v.g@list.ru, skvorcovan48@mail.ru, wener591@yandex.ru,

dbaimukanov@mail.ru, dauliet70@mail.ru, dilya_boneym@mail.ru

MORPHOTYPIC STRUCTURE OF HONEY BEES AND THEIR MORPHOLOGICAL CHANGES

Abstract. One of the key aspects of the preservation of endemic populations of modern honey bee breeds is research in the identification of their morphological characters in apiaries, as an assessment of the cleanliness of queen bees and the potential for restoration of populations.

The research material was a sampling of summer generation bees. The volume amounted to 640 individuals from 16 bee families in three districts of the forest-steppe and steppe honey flow areas (Margaushsky (3 families - apiary of the K.I.Michurin farm firm), Krasnoarmeysky (6 families from Pchelovodcheskoe OOO) - forest-steppe zone; Batyrevsky district (7 families from Pirozhkova N.P. farm) - steppe honey flow area). The assessment was carried out according to the common method, during which 15 traits were measured.

The studies of the morphotypic structure of honey bees revealed the dominant conformity of the identified classes of workers and drones to the standard of the Central Russian subspecies. The research results showed that the morphotype of working bees is represented by the prevailing class - **O** and the minimum represented - **1R**. The drones morphotype is represented only by class **O**. At the same time, a complex methodology, including an analysis of the "purity" of working bees and drones, allows us to note the genetic safety, both on the maternal lineage and the paternal side, respectively. However, studies of morphological abnormalities in *Apis mellifera* revealed eye color changes only in drones, namely brown or pomegranate and white eyes.

The studies have revealed the potential for preservation of the population of the European dark (Central Russian) bee breed in Chuvashia. The decrease in the minimum tergite value recorded in the Morgaushsky district beyond the standard frames of the Central Russian breed does not indicate the ongoing hybridization processes since this is the only one and can be explained by some random factors affecting biophysiological processes.

Key words: honey bees, workers, drones, morphotypes, morphological changes, eye color.

Introduction. According to experts, of the currently known 30 subspecies or breeds of honey bee (*Apis mellifera*), only the European dark bee (*Apis mellifera mellifera*) is adapted to life in conditions of low The bees of the European dark (Central Russian) subspecies differ in a whole complex of traits from the bees of other taxa. Moreover, they are also heterogeneous within these categories, forming the isolated groups (populations) adapted to one or another specific condition [2,3]. In the modern studies of honey bees, experts distinguish various populations (Bashkir, Ural mountain-taiga, Altai, etc.), which, to one degree or another, have an official status [4,5,6,7]. Analysis of periodicals and monographs emphasizes the absence of any detailed studies of honey bee populations in the territory of the Republic of Chuvashia and the identification of their status.

The aim of this work is a study of the morphotypic structure of *Apis mellifera* and an assessment of the morphometric characteristics of the honey bee workers in the territory of the Republic of Chuvashia.

Materials and methods. To study the morphotypic structure of *Apis mellifera*, the sampling was carried out in five regions covering all three honey flow areas of the republic: forest-steppe (Margaushsky (3 families - apiary of the K.I.Michurin farm firm), Krasnoarmeysky (4 families from Pchelovodcheskoe OOO), Krasnochetaysky (4 families from private apiaries)), forest (Shumerlinsky district (2 families - private apiary)) and a steppe honey flow area (Batyrevsky (6 families from Pirozhkova N.P. farms)). The total number of investigated working bees and drones was 1140 individuals, 570 each.

During the work, the methodology for assessing the classes of honey bee morphotypes according to F. Ruttner was used [8]. Identification was carried out visually using a handheld magnifier; when photographing, a Macro lens attachment was used on the LG Ray smartphone.

The following classes are distinguished by the color of the chitinous cover of the workers: **O - Central Russian subspecies; e; E; 1R; 2R; 3R** [9].

When identifying drones, according to the methodology, there are classes: **O; I₁; I₂; I₃; I₄; 1R**. At the same time, drones of the Central Russian subspecies can be represented by both classes **O** and **I₁** [9].

When assessing the morphometric characteristics of the working individuals of the honey bees, the research material was a sample of summer generation bees. The volume amounted to 640 bees of 16 bee families from three districts of the forest-steppe and steppe honey flow zones (Margaushsky (3 families - apiary of the K.I.Michurin farm firm), Krasnoarmeysky (6 families from Pchelovodcheskoe OOO) - forest-steppe zone; Batyrevsky district (7 families from Pirozhkova N.P. farm) - steppe honey flow area).

The morphology of workers was estimated according to the common method [1,9,10], during which 15 exterior traits were measured. For identification assessment of traits, it was used the standard of the European dark bee breed according to N.I. Krivtsov, 1995 [6]. The measurement was carried out using the MBS - 10 binocular microscope.

Results. The studies have shown that in the territory of Chuvashia, the morphotype of working bees is represented by the predominant class - **O** and the least represented - **1R**. The drones morphotype is represented only by class **O** (figure 1).




Figure 1 – Classes of honey bees morphotypes in the Republic of Chuvashia: A - workers, B - drones

In the sample of 19 families located in different honey flow areas, the bee morphotype corresponded to the standard of the Central Russian subspecies, both for working bees and for drones (table 1).

According to experts, one identified bee of the **1R** morphotype (0.2% of the sample of workers) cannot be an indicator of crossbreeding. Professor F. Ruttner noted that the sudden appearance of rings in bees of a uniform dark line is not a sign of crossbreeding [8].

Table 1 – Morphotypes of working bees and drones

District	Total number of bees	Number of workers	Morphotype class, units (%)		Number of drones	Morphotype class, units (%)
			O	1R		O
<i>The forest-steppe honey flow area</i>						
Krasnoarmeysky	240	120	120 (100%)	–	120	120 (100%)
Krasnochetaisky	240	120	120 (100%)	–	120	120 (100%)
Margaushsky	180	90	90 (100%)	–	90	90 (100%)
Total for the area	660	330	330 (100%)	–	330	330 (100%)
<i>Steppe honey flow area</i>						
Batyrevsky	360	180	179 (99.5%)	1	180	180 (100%)
Total for the area	360	180	179 (99.4%)	1 (0.6%)	180	180 (100%)
<i>Forest honey flow area</i>						
Shumerlinsky	120	60	60 (100%)	–	60	60 (100%)
Total for the area	120	60	60 (100%)	–	60	60 (100%)
Total in the Republic	1140	570	569 (99.8%)	1 (0.2%)	570	570 (100%)

Given the importance of studies of nontypical morphological changes in living organisms, the work was carried out to identify eye color abnormalities in workers and drones (table 2).

Table 2 – Morphological changes in the eyes of drones

District	Number of drones	Morphological state of eyes		
		Normal	brown or pomegranate	white
<i>The forest-steppe honey flow area</i>				
Krasnoarmeysky	120	63 (52.5%)	57 (47.5%)	–
Krasnochetaisky	120	77 (64.2%)	42 (35.0%)	1 (0.8%)
Margaushsky	90	80 (88.9%)	10 (11.1%)	–
Total for the area	330	220 (66.7%)	109 (33.0%)	1 (0.3%)
<i>Steppe honey flow area</i>				
Batyrevsky	180	157 (87.2%)	23 (12.8%)	–
Total for the area	180	157 (87.2%)	23 (12.8%)	–
<i>Forest honey flow area</i>				
Shumerlinsky	60	42 (70%)	18 (30%)	–
Total for the area	60	42 (70%)	18 (30%)	–
Total in the Republic	570	419 (73.5%)	150 (26.3%)	1 (0.2%)

At the same time, color changes were not detected in workers, and two types of deviations were recorded in drones, namely, brown or pomegranate and white eyes (figure 2).



Figure 2 – Morphological anomalies of the eyes of drones: 1 - normal eyes; 2 - brown or pomegranate eyes; 3 - white eyes

In numerical ratio, the maximum number (33.0%) of drones with brown or pomegranate eyes was registered in the forest-steppe area (Table 2). Also, one drone with white eyes (0.3%) was recorded in the apiary of this territory. In the steppe and forest honey flow areas, drones with only brown or pomegranate eyes were observed - 12.8% (steppe zone) and 26.3% (forest zone).

Consequently, studies of the morphotypic structure of honey bees in the Chuvash Republic revealed the dominant conformity of the identified classes of workers and drones to the standard of the Central Russian subspecies. At the same time, a comprehensive methodology, including an analysis of the "purity" of working bees and drones, allows noting the genetic safety, both on the maternal and paternal lineages. In the opinion of some specialists, the drones belonging to the standard of one subspecies, with competent selective and breeding work (creating a "drone barrier"), allows in the future to form a purebred breeding area, and further to create an array or area with purebred bees.

However, investigations of morphological abnormalities in *Apis mellifera* revealed eye color changes only in drones. This fact allows us to note possible changes in the environmental situation that causes mutational processes. Even F. Ruttner (1981) noted that there were mutations that interfered with the normal color of point and facet eyes. Since the formation of pigments depends on many hereditary foundations, there is the possibility of the appearance of various eye mutations.

Analysis of the research results of the morphometric characteristics of working individuals revealed the presence of Central Russian bees in the territory of Chuvashia, this fact suggests the presence of a separate population of European dark breed in this area.

The indicators of the average value of the proboscis length of the bees, as well as the *Lim* limits in all the studied administrative districts, corresponded to the European dark breed: 6.28 mm - Krasnoarmeysky, 6.20 mm - Batyrevsky and 6.28 mm - Morgaushsky (standard - 5.75-6.80 mm).

Data on the length of the right front wing of the workers also emphasize the presence of Central Russian bees at all sampling places: 9.30 mm - Krasnoarmeysky, 9.21 mm - Batyrevsky and 9.25 mm - Morgaushsky (standard - 9.1-10.2 mm). A similar situation is observed in terms of the width of the wing. The investigated trait in all bees does not go beyond the limits of the corresponding standard (2.0-3.2 mm).

According to the cubital honeycomb, given the lack of standards for the length and width of the forming veins, the taxonomic affiliation of honey bees can be regarded only by the cubital index. In this case, as in the previously considered indicators, the index corresponds to the standard of the European dark breed: 62.3 ± 2.39 - Krasnoarmeysky, 61.5 ± 1.62 - Batyrevsky, and 62.3 ± 1.43 - Morgaushsky (standard - 60-65%).

By the length of tergite, the working bees of all administrative districts correspond to the standard, but according to the *Lim* width of this trait, in the Morgaushsky district, a decrease in the minimum indicator for the sample beyond the standard frames (4.5-5.1 mm) of the Central Russian breed is noted - 4.10-4.84 mm.

The indicators of the sternite length (average values and *Lim*) as well as the considered characteristics are aligned with the standards of indigenous bees (2.6-3.2 mm). The same was recorded in terms of width, i.e. the bees from the studied sample corresponded to the Central Russian breed (standard is 4.75-5.50).

Wax mirrors, which are one of the main vital structures of the body, were characterized by average lengths and *Lim* values corresponding to Central Russian bees: 1.74 ± 0.01 (1.73-1.75 mm) -

Krasnoarmeysky, 1.69 ± 0.08 (1.55-1.75 mm) - Batyrevsky and 1.64 ± 0.05 (1.51-1.70) - Morgaushsky (standard - 1.5-1.75 mm). According to the values of the width of the wax plate, the workers also corresponded to the standard of this breed (2.35-2.75 mm).

According to the parameters of the right rear leg, as well as the cubital honeycomb, there are no standards for the length and width of tarsus in literary sources. The results of estimating the average values of the tarsal index and Lim revealed the compliance of bees of all samples with the standard of the European dark breed: 54.1 ± 0.54 - Krasnoarmeysky, 53.3 ± 0.92 - Batyrevsky and 52.4 ± 0.31 - Morgaushsky (standard according to N. I. Krivtsov - 52-58%, 50-55% according to the common standards).

Conclusion. These studies carried out as part of an inventory of the taxonomic belonging of the bee population in the Chuvash Republic, as well as an assessment of morphological abnormalities, revealed the preservation of the Central Russian subspecies in this territory and some distribution of eye color anomalies. Further scientifically based breeding and veterinary measures, as well as the collection of information on other administrative regions, will help maintain stability, quantitative and qualitative composition of the population of the Central Russian subspecies in the republic. Most importantly, the research results would allow planning activities in the beekeeping and cultivation of certain types of cereal crops, in particular triticale [12,13], throughout the Chuvash Republic.

Studies of the morphometric characteristics of *Apis mellifera* workers in apiaries, primarily engaged in selection and breeding and subsequently distributing the breeding material to commodity apiaries in the Chuvash Republic, found the presence of genetically and biologically “clean” material for maintaining and preserving the population of Central Russian honey bees in this territory. In our opinion, a decrease in the minimum value of bee tergite length in the Morgaushsky district beyond the standard of the Central Russian breed does not indicate the ongoing hybridization processes taking into account that this fact is the only one and can be explained by some random factors affecting the biophysiological processes.

At the same time, the carried out work and the results are of scientific and practical importance in creating an information base on the honeybee population of the Central Russian breed in Chuvashia, i.e. according to the literature [4,5,6,12], only detailed studies of the morphometric traits of bees of Vladimir, Tatar, Vologda, Oryol, Novosibirsk, Chelyabinsk, Bashkir and some other populations are known.

**В. Г. Семенов¹, А. И. Скворцов¹, В. Н. Саттаров²,
Д. А. Баймұқанов^{3,5}, Д. А. Дошанов⁴, Д. К. Карибаева⁵**

¹Чуваш мемлекеттік ауылшаруашылық академиясы, Чебоксары, Чуваш Республикасы, Ресей;

²Ақмола атындағы Башкир мемлекеттік педагогикалық университеті, Уфа, Ресей;

³Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан;

⁴М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан;

⁵«Қазақ малшаруашылығы және жем өндірісі ғылыми-зерттеу институты» ЖШС, Алматы, Қазақстан

БАЛ АРАСЫНЫҢ МОРФОТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ

Аннотация. Жұмыстың мақсаты – *Apis mellifera*-ның морфотиптік құрылымын зерттеу және Чуваш Республикасындағы жұмысшы бал араларының морфометриялық сипаттамаларын бағалау.

Жұмыс істейтін аралардың морфологиясы жалпы қабылданған әдіс бойынша бағаланды, 15 сыртқы белгілер өлшенді. Таңбаларды сәйкестендіру үшін Н.И. Кривцов (1995 ж.) негіздеген орталық орыс ара тұқымының стандарты пайдаланылды. Өлшем MBS-10 бинокулярлы микроскоп арқылы жүзеге асырылды.

Бал арасының морфотиптік құрылымын зерттеу барысында жұмысшы және аталық ара класының орталық орыс ара тұқымының стандартына сәйкес келетіні анықталды. Зерттеу нәтижелері жұмысшы аралардың морфотипі басым класы – **О** және ең азы – **1R**. Еркек аралардың морфотипі тек **О** класы арқылы ұсынылған. Сонымен қатар, күрделі жұмыс әдісі, жұмыс істейтін ара мен аталық ара «тазалығын» талдау аналық жағынан да, аталық жағынан да гендік информацияның сақталатынын ескеру қажеттігі айқындалды. Алайда *Apis mellifera*-ны зерттеуде морфологиялық ауытқуы тек аталық араның көзінің қоңыр немесе анар түске және ақ түске өзгерісі барысында анықталды.

Араның тұмсық ұзындығының орташа мәні, сондай-ақ барлық зерттелген әкімшілік аудандардағы *Lim* орталық орыс ара тұқымына сәйкес келді: 6,28 мм – Красноармейский, 6,20 мм – Батыревский және 6,28 мм – Моргаушский (стандарт – 5.75-6.80 мм).

Жұмысшы аралардың оң жақ алдыңғы қанатының ұзындығы туралы мәліметтер, сонымен қатар, барлық іріктеу пункттерінде орталық орыс арасының болғандығын көрсетеді: 9,30 мм - Красноармейский, 9,21 мм - Батыревский және 9,25 мм - Моргаушский (стандартты - 9.1-10.2 мм)) Ұқсас жағдай қанаттың ені бойынша байқалады. Барлық аралардағы зерттелетін белгілер тиісті нормадан аспайды (2,0-3,2 мм).

Кубиталды клетка, қалыптасатын тамырлардың ұзындығы мен ені бойынша стандарттардың жоқтығына байланысты бал араларының таксономиялық құрамын тек кубиталды индекс бойынша қарастыруға болады. Бұл жағдайда бұрын қаралған индикаторлардағыдай, индекс Орталық Ресей тұқымының стандартына сәйкес келеді: $62,3 \pm 2,39$ - Красноармейский, $61,5 \pm 1,62$ - Батыревский және $62,3 \pm 1,43$ - Моргаушский (стандартты - 60-65%).

Тергиттің ұзындығы бойынша барлық әкімшілік аудандарда жұмысшы аралар стандартқа сәйкес келеді, бірақ Моргаушский ауданында осы белгі ені *Lim-ge* сәйкес, орталық орыс тұқымының стандартынан тыс (4,5-5,1 мм) үлгі бойынша минималды көрсеткіштің төмендегені байқалды – 4,10-4,84 мм.

Стернит ұзындығының индикаторлары (орташа мән және *Lim*), сондай-ақ қарастырылған сипаттамалар отандық ара стандарттарына сәйкес келеді (2,6-3,2 мм). Ені бойынша ұқсастығы анықталды. Зерттелген үлгідегі аралар орталық орыс тұқымына сәйкес келді (стандарт 4.75-5.50).

Балауыз айнасы дененің негізгі өмірлік құрылымдарының бірі болып саналады және орташа ұзындығы бойынша және *Lim*, орташа орыс аралықтарына сәйкес келетін мәні бойынша сипатталды: $1,74 \pm 0,01$ (1,73-1,75 мм) - Красноармейский, $1,69 \pm 0,08$ (1,55-1,75 мм) - Батыревский және $1,64 \pm 0,05$ (1,51-1,70) – Моргауш-ский (стандартты - 1,5-1,75 мм). Балауыз айна енінің мәніне сәйкес жұмыс істейтін аралар да осы тұқымның стандартына сәйкес келді (2.35-2.75 мм).

Оң жақ артқы аяқтың, сондай-ақ кубиталды жасуша параметрлеріне сәйкес әдеби дереккөздерде төменгі аяғының ұзындығы мен ені бойынша нормалар жоқ. Тарсаль индексі мен Лимнің орташа мәнін бағалау нәтижелері барлық үлгілердің ара балының орталық орыс ара тұқымының стандартына сәйкестігін анықтады: $54,1 \pm 0,54$ - Красноармейский, $53,3 \pm 0,92$ - Батыревский және $52,4 \pm 0,31$ - Моргаушский (N стандартты). Кривцов жалпы қабылданған стандарттарға сәйкес 52-58%, 50-55%).

Түйін сөздер: бал аралары, жұмысшы аралар, аталық аралар, морфотиптер, морфологиялық өзгерістер, көзінің түсі.

В. Г. Семенов¹, А. И. Скворцов¹, В. Н. Саттаров²,
Д. А. Баймуканов^{3,5}, Д. А. Дошанов⁴, Д. К. Карибаева⁵

¹Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
Чебоксары, Чувашская Республика, Россия;

²Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы, Уфа, Россия;

³Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан;

⁴Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан;

⁵ТОО «Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства»,
Алматы, Казахстан

МОРФОТИПНАЯ СТРУКТУРА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Аннотация. Цель настоящей работы – изучение морфотипной структуры *Apis mellifera* и оценка морфометрических признаков рабочих особей медоносной пчелы на территории Республики Чувашия.

Оценку морфологии рабочих пчел проводили по общепринятой методике, в ходе которой измеряли 15 экстерьерных признаков. Для идентификационной оценки признаков использовали стандарт среднерусской породы пчел по Н.И. Кривцову (1995 г). Измерение проводили с помощью бинокулярного микроскопа МБС – 10.

Проведенные исследования морфотипной структуры медоносных пчел позволили выявить доминантное соответствие идентифицированных классов рабочих особей и трутней стандарту среднерусского подвида. Результаты исследований показали, что морфотип рабочих пчел представлен преобладающим классом – **О** и минимально представленным – **1R**. Морфотип трутней представлен только классом **О**. При этом комплексная методология, включающая анализ «чистоты» рабочих пчел и трутней, позволяет отметить генетическую сохранность как по материнской линии, так и по отцовской, соответственно. Вместе с тем исследования морфологических отклонений у *Apis mellifera* выявили цветовые изменения глаз только у трутней, а именно: коричневые или гранатовые глаза и белые.

Показатели среднего значения длины хоботка пчел, как и пределы *Lim*, во всех исследованных административных районах соответствовали среднерусской породе: 6,28 мм – Красноармейский, 6,20 мм – Батыревский и 6,28 мм – Моргаушский (стандарт – 5,75-6,80 мм).

Данные по длине правого переднего крыла рабочих особей также подчеркивают наличие среднерусских пчел во всех точках взятия проб: 9,30 мм – Красноармейский, 9,21 мм – Батыревский и 9,25 мм – Моргаушский (стандарт – 9,1-10,2 мм). Аналогичная ситуация наблюдается и по показателям ширины крыла. Исследованный признак у всех пчел не выходит за пределы соответствующего стандарта (2,0-3,2 мм). По кубитальной ячейке, в виду отсутствия стандартов длины и ширины образующих жилок, таксономическую принадлежность медоносных пчел можно рассматривать только по кубитальному индексу. В данном случае так же, как и по ранее рассмотренным показателям индекс соответствует стандарту среднерусской породы: $62,3 \pm 2,39$ – Красноармейский, $61,5 \pm 1,62$ – Батыревский и $62,3 \pm 1,43$ – Моргаушский (стандарт – 60-65 %).

По длине тергита рабочие пчелы всех административных районов соответствуют стандарту, но по *Lim* ширины данного признака в Моргаушском районе отмечается снижение минимального показателя по выборке за рамки стандарта (4,5-5,1 мм) среднерусской породы – 4,10-4,84 мм.

Показатели длины стерниты (средние значения и *Lim*) так же как и рассмотренные признаки соответствуют стандартам аборигенных пчел (2,6-3,2 мм). Аналогичная ситуация зарегистрирована и по показателям ширины, т.е. пчелы из исследованной выборки соответствовали среднерусской породе (стандарт 4,75-5,50).

Восковые зеркальца, являющиеся одним из основных жизненно важных структур организма, характеризовались показателями средних значений длины и *Lim* соответствующими среднерусским пчелам: $1,74 \pm 0,01$ (1,73-1,75 мм) – Красноармейский, $1,69 \pm 0,08$ (1,55-1,75 мм) – Батыревский и $1,64 \pm 0,05$ (1,51-1,70) – Моргаушский (стандарт – 1,5-1,75 мм). По значениям ширины воскового зеркальца рабочие пчелы соответствовали также стандарту данной породы (2,35-2,75 мм).

По параметрам правой задней ножки, так же как и по кубитальной ячейке, стандарты длины и ширины голени в литературных источниках отсутствуют. Результаты оценки средних значений тарзального индекса и *Lim* выявили соответствие пчел всех проб стандарту среднерусской породы: $54,1 \pm 0,54$ – Красноармейский, $53,3 \pm 0,92$ – Батыревский и $52,4 \pm 0,31$ – Моргаушский (стандарт по Н.И.Кривцову – 52-58 %, 50-55 % по общепринятым стандартам).

Ключевые слова: медоносные пчелы, рабочие пчелы, трутни, морфотипы, морфологические изменения, цвет глаз.

Information about the authors:

Semenov Vladimir Grigoryevich, Doctor of Biological Sciences, professor, Honored Worker of Science of the Chuvash Republic, professor of the Department of Morphology, Obstetrics and Therapy, Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Chuvash Republic, Russia; semenov_v.g@list.ru; <https://orcid.org/0000-0002-0349-5825>

Skvortsov Anatoly Ivanovich, Candidate of agricultural sciences, degree seeker of the Department of Morphology, Obstetrics and Therapy, Chuvash State Agricultural Academy, Cheboksary, Chuvash Republic, Russia; skvorcovan48@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-9357-8765>

Sattarov Vener Nurulloevich, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Bioecology and Biological Education, Bashkir State Pedagogical University named after Akmulla, Ufa, Russia; wener5791@yandex.ru; <https://orcid.org/0000-0001-6331-4398>

Baimukanov Dastanbek Asylbekovich, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, chief researcher of the Bayserke-Agro Educational Scientific and Production Center LLP, Talgar district, Almaty region, Kazakhstan; dbaimukanov@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0002-4684-7114>

Doshanov Dautlet Askarovich, Candidate of Agricultural Sciences, M. Auezov South Kazakhstan State University. Shymkent, Kazakhstan; dautlet70@mail.ru;

Karibayeva Dilaram Keudenbayevna, Candidate of agricultural sciences, associate professor, senior researcher of the Department of scientific and information support of the Kazakh Scientific Research Institute of Animal Breeding and Fodder Production, Almaty, Kazakhstan; dilya_boneym@mail.ru; <https://orcid.org/0000-0001-9924-5136>

REFERENCES

- [1] Illyasov R.A., Poskryakov A.V., Nikolenko A.G. (2016) Current status and conservation of the *Apis mellifera mellifera* gene pool in Russia and European countries [*Sovremennoye sostoyaniye i sokhraneniye genofonda Apis mellifera mellifera v Rossii i stranakh Yevropy*] // Beekeeping. M. N 1. P. 10-13 (in Russ.).
- [2] Alpatov V.V. (1948) Honey bee breeds. M. [*Porody medonosnoy pchely*]. MOISP. 183 p. (in Russ.).
- [3] Brandorf A.Z., Ivoilova M.M., Illyasov R.A., Poskryakov A.A., Nikolenko A.G. (2012) Population-genetic differentiation of honey bees in the Kirov region [*Populyatsionno-geneticheskaya differentsiatsiya medonosnykh pchel v Kirovskoy oblasti*] // Beekeeping. M. N 7. P. 14-16 (in Russ.).
- [4] Konusova O.L., Pogorelov Yu.L., Ostroverkhova N.V., Nechipurenko A.O., Vorotov A.A., Klimova E.A., Prokopyev A.S. (2009) Honey bee and beekeeping in the Tomsk region: past, present, and future [*Medonosnaya pchela i pchelovodstvo v Tomskoy oblasti: proshloye, nastoyashcheye i budushcheye*] // Bulletin of Tomsk State University. Biology. Tomsk. N 4 (8). P. 15-28. (in Russ.).
- [5] Krivtsov N.I. (1995) Central Russian bees [*Srednerusskiye pchely*]. SPb. Lenizdat. 126 p. (in Russ.).
- [6] Morev I.A., Moysya A.A. (2017) The species composition of bees in the Krasnodar Krai [*Porodnyy sostav pchel Krasnodarskogo kraya*] // Beekeeping. M. N 5. P. 6-9 (in Russ.).
- [7] Ruttner F. (1969) The races of bees: a guide. [*Rasy pchel: posobiye*] M. Publishing House Kolos. P. 30-44 (in Russ.).
- [8] Ruttner F. (2006) The breeding technique and breeding of bees [*Tekhnika razvedeniya i selektsionnyy otbor pchel*]. practical guide. Moscow. Publishing house AST Astrel. 166 p. (in Russ.).
- [9] Lomaev G.V., Kolbina L.M. (2004) Dynamics of changes in the exterior signs of Prikamye bees [*Dinamika izmeneniya ekster'yernykh priznakov pchel Prikam'ya*] // Beekeeping. M. N 2. P. 15-17 (in Russ.).
- [12] Safiullin R.R. (2009) Problems and prospects for the development of beekeeping in the Republic of Tatarstan [*Problemy i perspektivy razvitiya pchelovodstv Respubliki Tatarstan*]. Proceedings of coordination conference and 9th scientific-practical. conf. Interhoney is new in the science and practice of beekeeping. Fish. NIIP. P. 16-20 (in Russ.).
- [13] Mefodyev G.A., Shashkarov L.G., Semenov V.G., Baimukanov D.A., Karibayeva D.K. (2019) Comparative assessment of varieties of the spring triticale // Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Vol. 1, N 377 (2019), 21-26. ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 (Print). <https://doi.org/10.32014/2019.2518-1467.3>

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www.nauka-nanrk.kz

ISSN 2518-1467 (Online), ISSN 1991-3494 (Print)

<http://www.bulletin-science.kz/index.php/en/>

Редакторы *М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, А. Ахметова*
Верстка на компьютере *Д. А. Абдрахимовой*

Подписано в печать 14.10.2020.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
21 п.л. Тираж 500. Заказ 5.